

QUICK TAKE

ABORDAJE DE LA MPX EN COMUNIDADES NEGRAS Y LATINAS

La MPX (ALTERNATIVA A LA ESTIGMATIZANTE “MONKEYPOX”, en inglés y “VIRUELA SÍMICA”, en español) es endémica en África central y occidental y afecta principalmente a personas heterosexuales, pero ha afectado a una red mundial de hombres que se relacionan sexualmente con hombres (HSH) y a mujeres transgénero. Esta nueva cepa se diagnosticó primero en EE.UU. el 18 de mayo y se convirtió en una crisis mundial.

Como se vio con COVID-19, los diagnósticos de MPX entre la población negra y latina no tardaron en sobrepasar su proporción con respecto a la población total de EE.UU.. La escasez de pruebas (especialmente en los grupos marginados) y la falta de datos demográficos completos sobre los casos hacen que los responsables políticos y las comunidades no sepan dónde ni cómo actuar eficazmente.

MANOS A LA OBRA

Es probable que los impactos desproporcionados de la MPX entre los HSH en las comunidades negras, latinas y otras comunidades de color persistan. PODEMOS ACTUAR:

ADMINISTRACIÓN BIDEN-HARRIS: EXIGIR EQUIDAD EN TODAS LAS RESPUESTAS FEDERALES

El presidente debe expresar públicamente su compromiso con una respuesta de atención a la MPX centrada en HSH y personas trans de color. La Administración debe garantizar que todas las respuestas federales a la MPX se basen en la equidad.

DERECHOS CIVILES Y OTROS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL: INCLUIR MPX EN SU PLAN

Las organizaciones nacionales y locales (incluidas las organizaciones LGBTQIA+) y comunidades religiosas son voces confiables que deben abordar la MPX y garantizar respuestas políticas centradas en las poblaciones de HSH y trans de color.

ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA (OBC) PARA EL VIH: EDUCAR Y PROTEGER

Se necesita una movilización a nivel nacional de las OBC que parta de las respuestas en los primeros brotes y se base en un alcance culturalmente congruente y no estigmatizante dirigido por HSH y personas trans de color.

DEPARTAMENTOS DE SALUD: COMPROMETER Y FINANCIAR A SOCIOS DE LA COMUNIDAD

Algunos departamentos de salud no tardaron en distribuir vacunas contra MPX a socios comunitarios. En adelante, tales iniciativas deben crecer, y los departamentos de salud deben eliminar las barreras de contratación para que los socios de confianza en las comunidades de color LGBTQIA+ puedan ser financiados rápidamente. Además, los sistemas de vigilancia deben recopilar rutinariamente datos de orientación sexual/identidad de género (SOGI*) para responder a los casos de MPX en mujeres y hombres trans, incluyendo personas trans de color.

Según los datos nacionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los diagnósticos de MPX se dan entre HSH negros y latinos, y el 41% de los diagnósticos se dan entre personas que viven con VIH. La ciudad de Atlanta, Georgia, es un ejemplo de esta tendencia.

El 13 de julio, el 57% de los casos eran entre personas negras, pero el 21 de julio, el 63% de los casos eran de personas negras, el 6% de personas latinas y el 53% de personas que viven con VIH, de las cuales el 80% eran negras. Para el 9 de agosto, el 82% de los casos eran de población negra, el 6% de población latina y el 67% de personas que viven con VIH. (Véase Melanie Thompson (@drmt), Twitter, <https://bit.ly/3vZfudn>).

Se necesita una acción concertada para minimizar inequidades y atender de manera efectiva a las personas negras, latinas y otros HSH y personas transgénero de color.

En 2019, el 37% de todos los diagnósticos de VIH entre los HSH eran personas negras y el 33% latinas. Ese mismo año, estos hombres tenían menos probabilidades de ser atendidos dentro de 1 mes del diagnóstico y menos probabilidades de lograr una supresión viral sostenible que las personas blancas, lo que podría ponerlos en mayor riesgo de otras afecciones de salud, incluida la MPX (CDC *Surveillance Special Focus Profiles*, 2019).


Como ocurrió con el VIH (Millett, *Lancet*, 2012) y el COVID-19 (Millett, *Annals of Epidemiology*, 2020 / Rodríguez-Díaz, *Annals of Epidemiology*, 2020), la desproporción de diagnósticos de MPX puede deberse a diversos factores

ALTA REPRESENTACIÓN DE HSH NEGROS Y LATINOS EN DIAGNÓSTICOS DE MPX

(DATOS DE <40% CASOS, 17/MAYO A 22/JULIO DE 2022)

EE.UU. (TOTAL)

Datos de <40% de diagnósticos



Fuente: *Epidemiologic and Clinical Characteristics of Monkeypox Cases—United States, May 17–July 22, 2022*, 71 MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT—CTRS. FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (5 de ago., 2022).

AUTOPROTECCIÓN Y APOYO PÚBLICO EN EL ACTUAL BROTE

La salud sexual es esencial para la salud integral. Esto incluye aceptar la sexualidad y el placer. Los HSH negros y latinos necesitan ser tratados con dignidad y respeto al interactuar con médicos y entidades de salud pública.

CONSIDERACIONES DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

Para protegerse, conviene vacunarse contra la MPX tan pronto como sea posible y, después de la vacunación, limitar la exposición a la MPX durante varias semanas para que la vacuna pueda crear protección. Las estrategias

de protección incluyen la abstinencia sexual temporal, reducir parejas o limitar las relaciones sexuales dentro de redes pequeñas y cerradas, evitar locales de sexo grupal y limitar la exposición prolongada de la piel.

EL FOCO DEBEN SER LOS GRUPOS DE MAYOR RIESGO

Necesitamos una acción política afirmativa centrada en las comunidades afectadas y que no se centre demasiado en la transmisión limitada a heterosexuales.

sociales y estructurales de larga data, como mayores tasas de personas sin hogar o que viven en entornos congregados; carecer de seguro o tener un seguro deficiente; o tener acceso a menos servicios de atención médica. Las primeras respuestas al COVID-19 agravaron las inequidades sanitarias al situar los centros de pruebas más accesibles en barrios mayoritariamente blancos o conceder citas para vacunación a través de un sistema en línea que privilegiaba a quienes tenían un servicio de Internet rápido y flexibilidad para vacunarse durante la jornada laboral. En las primeras iniciativas de vacunación contra la MPX, se informó de que las citas vía Internet se agotaban en minutos, que los centros eran inaccesibles o de centros situados en barrios negros y latinos que se encontraban muy saturados de HSH blancos. Destacando la necesidad de un compromiso firme para abordar los factores sociales y estructurales de la inequidad.

Mientras nos centramos, con razón, en los HSH ante la MPX, debemos proteger a las comunidades negras y latinas

PERSONAS SIN HOGAR O ENCARCELADAS

Ya hay informes sobre diagnósticos de MPX entre las personas sin hogar (WaPo, 2022). Los jóvenes de minorías sexuales tienen más probabilidades de no tener hogar que los heterosexuales, y un número desproporcionado de jóvenes sin hogar pertenecen a comunidades de color. El *Sentencing Project* (2021) descubrió que los negros eran encarcelados casi cinco veces y los latinos 1,3 veces más que los blancos. Debido a que la MPX puede crecer en entornos congregados una vez introducida, la vigilancia, las pruebas, la asistencia médica y las vacunas deben estar disponibles para estas poblaciones.

MUJERES CISGÉNERO DE COLOR

Las mujeres cisgénero de color que se relacionan sexualmente con hombres pueden estar expuestas a la MPX, aunque se han diagnosticado pocos casos. La MPX puede complicar un embarazo y provocar consecuencias terribles en el útero. Dado que las personas embarazadas de color (especialmente negras) tienen menos probabilidades de recibir asistencia prenatal adecuada y a tiempo, y dado que la mayoría de los casos se

han producido entre HSH, las complicaciones derivadas de la infección por MPX pueden diagnosticarse tarde.

MUJERES Y HOMBRES TRANS DE COLOR

Mujeres y hombres trans que se relacionan sexualmente con HSH podrían adquirir MPX. Aunque escasos, han habido casos de MPX entre personas transgénero. No es raro que personas transgénero eviten la asistencia médica debido a la estigmatización y/o experiencias negativas por parte de los proveedores; lo que puede complicar la evolución de la MPX.

EMPLEADOS DE SERVICIOS (INCLUIDO TRABAJO SEXUAL, DOMÉSTICO Y OTROS)

En África, se han dado brotes de MPX entre el personal de hoteles. En EE.UU., los inmigrantes indocumentados y otros grupos vulnerables pueden tener más probabilidad de ocupar puestos cuyo riesgo de exposición al MPX es mayor. También trabajadores sexuales corren riesgo de contraer MPX, aunque los datos de vigilancia hasta ahora no han sido tan precisos como para identificar suficientes desgloses demográficos de los casos diagnosticados.

A lo largo del tiempo, el VIH ha seguido una trayectoria consistente de observarse más en poblaciones negras o de color y concentrarse más en el sur de los EE.UU. La tendencia de la MPX en EE.UU. podría ser similar, sobre todo en vista del mayor antagonismo hacia HSH y personas trans de color en el sur. Hacen falta estrategias proactivas para evitar que el estigma provoque la renuncia al diagnóstico, al tratamiento y a la vacunación. Estados Unidos puede crear una historia nueva actuando de forma rápida e integral para apoyar y valorar la salud y la vida de HSH y personas trans de color.

MÁS INFORMACIÓN

Lea nuestro *Big Ideas Brief, Monkeypox and Meningococcal Disease Outbreaks Signal New Health Threats for Communities Heavily Impacted by HIV and Demand Immediate Action*, 18 de julio de 2022, disponible en el enlace abajo.

**O'NEILL
INSTITUTE**
FOR NATIONAL & GLOBAL HEALTH LAW

GEORGETOWN LAW

amfAR

MAKING AIDS HISTORY

12 DE AGOSTO DE 2022

Este Quick Take es un producto de la Infectious Diseases Initiative del **O'Neill Institute for National and Global Health Law** y fue desarrollado con el respaldo financiero de **Gilead Sciences, Inc.** Gilead Sciences, Inc. no ha participado en la elaboración de este documento. Se elaboró en colaboración con **amfAR, la Fundación para la Investigación del SIDA.**

Su autoría es de **Landon Myers** y **Jeffrey S. Crowley** (O'Neill Institute) y **Greg Millett** (amfAR). Las opiniones expresadas son únicamente las de los autores.

<http://bit.ly/USHIVpolicyproject>